- HAS : **Prise en charge du 1er épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois** (nov 2019)

—> fiche outil « Prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois » https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/hascnpp_bronchiolite_fiche_outil_pec_bronchiolite_coi_2019_10_10_vd.pdf

- Ordre Kiné « Bronchiolite : les recommandations de la HAS mal interprétées. La kinésithérapie est essentielle dans la prise en charge de labronchiolite du nourrisson » https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2019/11/cp_bronchiolite-kine-2.pdf

- Ordre Kiné « Prise en charge prescrite de la bronchiolite aigue du nourrisson par le masseur-kinésithérapeute » https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/11/texte-definitif-2023.pdf

- « Kinésithérapie respiratoire dans le traitement de la bronchiolite aiguë chez des patients pédiatriques âgés de 0 à 24 mois » https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004873.pub6/full/fr

- Ordre Kiné « La kinésithérapie est un atout majeur pour aider au confort des nourrissons atteints de bronchiolite » https://www.ordremk.fr/actualites/ordre/la-kinesitherapie-est-un-atout-majeur-pour-aider-au-confort-des-nourrissons-atteints-de-bronchiolite/